

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DU LANGUEDOC - ROUSSILLON
MONTPELLIER - 16, rue de la République - Tél. 72.58.72

3ème Année

N°

4

17 Février 1955

23 FEV 1955

Première Edition Régionale n° 2

AVERTISSEMENTS

Zones I - II - III

MONILIA de l'ABRICOTIER

Les chutes de pluies actuelles provoqueront de nouvelles contaminations qu'un traitement immédiat et minutieux peut prévenir. Utiliser :

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| - Bouillie bordelaise à 2% | - Sulfate basique de cuivre (| aux doses prescrites |
| | - Oxyde cuivreux (| par les |
| | - Oxychlorure de cuivre (| fabricants |

CLOQUE DU PECHER

Sur les arbres dont les boutons floraux sont gonflés, effectuer une pulvérisation soignée avec :

- | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| - Bouillie bordelaise à 2% | - Ferbame à 0,5% | - Captane à 0,3% |
|----------------------------|------------------|------------------|

INFORMATIONS

Zones I - II - III

CORYNEUM

Traiter tous les arbres fruitiers à noyaux avec une bouillie cuprique.

GNOMONIA DU CERISIER

Un traitement à l'aide d'une bouillie bordelaise à 2%, au moment du gonflement des bourgeons, assurera une protection efficace contre cette maladie qui s'étend dans les cultures des Cévennes, de la Montagne Noire et de la haute-vallée du Tarn.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux;

P. BERVILLÉ

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,

L.L.TROUILLON

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Languedoc-Roussillon 16 rue de la République, Montpellier - Le Gérant : R.BERTRAND. Autorisation du 23/I/53. Reproduction, adaptation réservées.

74